

如何領用COVID-19口服抗病毒藥

開立處方箋 (電話或視訊問診、親友代診)

健康益友APP



基層診所

看診流程
請詢問各基層診所

防疫門診或視訊門診

醫院 (如：市立
聯醫/台大/三總)

請至各醫院
網站查詢

中正紀念堂
防疫急門診

網路掛號
(掃描QR code)



臺北榮總
門診

網路掛號
(掃描QR code)



領用藥品地點

全台約190間醫院

全台約60間核心藥局
(僅提供Paxlovid)

可領用抗病毒藥之醫院及藥局名單，
請Google：「CDC口服用藥」查詢

看診注意事項

看診前，請備妥

病人健保卡

+

(符合右列其中之一)
確診證明

- 1 法定傳染病編號
- 2 數位新冠病毒健康證明
- 3 同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖
- 4 已寫上姓名及檢測日期之快篩卡匣

看診時，請主動告知以下事項

主動告知
正在使用的藥品

是否使用鼻胃管灌
飲食或有吞嚥困難

主動提供
肝腎功能檢驗數值

是否有懷孕可能
或正在授乳



臺北榮民總醫院 與您並肩戰疫 祝您早日康復

Paxlovid 使用說明 (腎功能正常者)

更新日期：111 年 5 月 26 日

1. 誰可以使用 Paxlovid?

Paxlovid 不是預防用藥，
使用需同時符合以下條件：

- 1 確診 **COVID-19**
- 2 發病 **5 日內**且**未**使用氧氣
Paxlovid 需 **≥12 歲**、**≥40 公斤**
- 3 合併任一**重症風險**因子

重症風險因子

- 糖尿病
- 年齡 **≥65 歲**
- 癌症
- 慢性腎病
- 心血管疾病 (不含高血壓)
- 慢性肺疾 (間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
- 結核病
- 慢性肝病 (肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
- 失能 (注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)
- 精神疾病 (情緒障礙、思覺失調症、失智症)
- **BMI ≥30** (或 12-17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位)
- 影響免疫功能之疾病 (HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)
- 懷孕與產後 **6 週內**婦女 (僅適用 Paxlovid，不適用 Molnupiravir)

2. 使用前須確認哪些事項?

主動告知正在
使用的**藥品**

部分藥品與 Paxlovid 併用，
可能造成嚴重交互作用，
需視情況調整用藥！

是否有**懷孕**可
能或正在**授乳**

懷孕經評估當效益大於風險時，
可使用 Paxlovid

主動提供
肝腎功能
檢驗數值

- 腎功能不全 (eGFR 30-59 ml/min) 需調降 Paxlovid 劑量
- eGFR < 30 ml/min 或嚴重肝功能不全 (Child Pugh C)，
不建議使用 Paxlovid

是否使用
鼻胃管或
吞嚥困難

- Paxlovid 需整顆吞服，
不得咀嚼、分開或壓碎
- 如需管灌請選擇
Molnupiravir，可考慮打
開膠囊配置口服懸浮液

3. 如何使用 Paxlovid (腎功能正常者)?

Paxlovid

使用方式

白天吃
黃色半邊

晚上吃
藍色半邊



(每盒為 1 人份)

症狀出現 **5** 天內使用
完整療程為 **5** 天
每日服用 **2** 次

腎功能正常：每次服用 **3** 顆



2 顆粉紅色 + 1 顆白色

忘記服藥怎麼辦?

- 8 小時內：立刻補服
- 超過 8 小時：
請跳過，並於下次吃
藥時間正常服用

注意事項

- 本藥品含 2 種成分，**需同時服用**才有療效！(粉紅色錠：nirmatrelvir、白色錠：ritonavir)
- **需整顆吞服**，不得咀嚼、
分開或壓碎！



Paxlovid 使用說明 (腎功能不佳者)

更新日期：111 年 5 月 26 日

1. 誰可以使用 Paxlovid?

Paxlovid 不是預防用藥，
使用需同時符合以下條件：

- 1 確診 **COVID-19**
- 2 發病 **5 日內**且**未**使用氧氣
Paxlovid 需 ≥ 12 歲、 ≥ 40 公斤
- 3 合併任一**重症風險**因子

重症風險因子

- 糖尿病
- 年齡 ≥ 65 歲
- 癌症
- 慢性腎病
- 心血管疾病 (不含高血壓)
- 慢性肺疾 (間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
- 結核病
- 慢性肝病 (肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
- 失能 (注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)
- 精神疾病 (情緒障礙、思覺失調症、失智症)
- **BMI ≥ 30** (或 12-17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位)
- 影響免疫功能之疾病 (HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)
- 懷孕與產後 6 週內婦女 (僅適用 Paxlovid，不適用 Molnupiravir)

2. 使用前須確認哪些事項?

主動告知正在
使用的**藥品**

部分藥品與 Paxlovid 併用，
可能造成嚴重交互作用，
需視情況調整用藥！

是否有**懷孕**可
能或正在**授乳**

懷孕經評估當效益大於風
險時，可使用 Paxlovid

主動提供
肝腎功能
檢驗數值

- 腎功能不全 (eGFR 30-59 ml/min) 需調降 Paxlovid 劑量
- eGFR < 30 ml/min 或嚴重肝功能不全 (Child Pugh C)，
不建議使用 Paxlovid

是否使用
鼻胃管或
吞嚥困難

- Paxlovid 需整顆吞服，
不得咀嚼、分開或壓碎
- 如需灌請選擇
Molnupiravir，可考慮打
開膠囊配置口服懸浮液

3. 如何使用 Paxlovid (腎功能不佳者)?

Paxlovid

使用方式

白天吃
黃色半邊

晚上吃
藍色半邊



(每盒為 1 人份)

症狀出現 **5** 天內使用
完整療程為 **5** 天
每日服用 **2** 次

腎功能不佳: 每次服用 **2** 顆



1 顆粉紅色 + 1 顆白色

忘記服藥怎麼辦?

- 8 小時內: 立刻補服
- 超過 8 小時:
請跳過，並於下次吃
藥時間正常服用

注意事項

- 本藥品含 2 種成分，**需同時服用**才有療效！(粉紅色錠: nirmatrelvir、白色錠: ritonavir)
- **需整顆吞服**，不得咀嚼、
分開或壓碎！



Molnupiravir 使用說明

更新日期：111 年 5 月 26 日

1. 誰可以使用 Molnupiravir?

Molnupiravir 不是預防用藥
使用需同時符合以下條件：

- 1 確診 **COVID-19**
- 2 發病 **5 日內**且**未**使用氧氣
Molnupiravir 需 **≥18 歲**
- 3 合併任一**重症風險**因子

重症風險因子

- 糖尿病
- 年齡 **≥65 歲**
- 癌症
- 慢性腎病
- 心血管疾病 (不含高血壓)
- 慢性肺疾 (間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
- 結核病
- 慢性肝病 (肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
- 失能 (注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)
- 精神疾病 (情緒障礙、感覺失調症)、失智症
- **BMI ≥30** (或 12-17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位)
- 影響免疫功能之疾病 (HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)

2. 使用前須確認哪些事項?

是否有**懷孕**可能
或
正在**授乳**

女生

於 **治療期間** 和
最後一劑後 **4 天內**
應**避**孕、**不**哺乳！

男生

於 **治療期間** 和
最後一劑後 **3 個月內**
應**避**孕！

3. 如何使用 Molnupiravir?

Molnupiravir



(每瓶為 1 人份)

使用方式

症狀出現 **5 天**內使用
完整療程為 **5 天**
每 **12 小時**服用 **1 次**

每次服用 **4 粒**



忘記服藥怎麼辦?

- 10 小時內: 立刻補服
- 超過 10 小時:
請跳過, 並於下次吃藥時間正常服用

注意事項

管灌的病人, 可打開膠囊以 40 cc 的水混合後, 於 1 小時內服用



COVID-19 治療用口服抗病毒藥品說明

更新日期：111 年 5 月 26 日

Paxlovid 可能會跟哪些藥品產生交互作用？

絕對不可併用

建議改用其他 COVID-19 抗病毒藥品

抗心律
不整藥
Amiodarone

Carbamazepine
抗癲癇藥
Phenobarbital
Phenytoin

抗結核藥
Rifampin
Rifapentin

可使用 Paxlovid，但下列藥品須改為替代用藥或停用，並於 Paxlovid 療程結束 3 天後復藥

抗凝血劑
Apixaban
Rivaroxaban

抗血小板藥
Clopidogrel

抗癲癇藥
Clonazepam

抗精神病藥
Clozapine

抗焦慮藥
Diazepam
Midazolam

支氣管擴張劑
Salmeterol

胃腸藥
Domperidone

C 肝藥
Glecaprevir/
pibrentasvir
(Maviret®)

免疫抑制劑
Cyclosporine
Everolimus

降血脂藥
Lovastatin
Simvastatin

麥角衍生物
Ergometrine

草藥
聖約翰草
St. John's
Wort

註：本表列舉證據等級較明確之嚴重交互作用，並將依文獻修訂更新。





臺北榮總受理民眾持 其他院所釋出 Paxlovid 處方箋之領藥流程

Step 1 先至藥師公會全聯會網頁「藥師調劑諮詢送藥到府藥局地圖查詢」確認就近領藥

為增加您領藥的便捷性，建議先至藥師公會全聯會網頁「藥師調劑諮詢送藥到府藥局地圖查詢」（網址：https://www.taiwan-pharma.org.tw/public/pharmacy_gohome.php），查詢您所在縣市的核心藥局，先以電話聯絡確認相關資訊（含處方內容、領藥時間、領藥藥局等），由親友代持處方箋就近領藥。

Step 2 若欲至本院領藥

請代領人務必攜帶

1 病人健保卡
(外籍人士可用居留證、護照代替)



2 Paxlovid 之處方箋



領藥時間

週一至週五 09:00-17:00
(週末及例假日暫停受理)

領藥地點

本院第三門診大樓 1 樓
門診藥局用藥諮詢窗口

注意事項

- 本院配合指揮中心政策發予 Paxlovid 藥品，若有處方或用藥問題需洽詢原診治醫療院所。
- 本服務僅受理 Paxlovid 藥品之發放，若您就診同時有開立其他用藥，請於該院所或社區藥局領取其他藥品。
- 代領人若未攜帶病人健保卡，恕本院無法受理。若外籍病人不具健保身分，請攜帶病人居留證（無居留證者得以護照代替）。



諮詢電話：(02) 2875-7282

臺北榮總藥學部 關心您